ການປ້ອງກັນພະຍາດ ໃນຝູງສັດປີກ

ສັດປີກແຂງແຮງ ຄົນແຂງແຮງ

ຖ້າທ່ານພົບເຫັນສັດປີກເຫງົາ ຫຼື ຕາຍ ໃຫ້ລາຍງານດ່ວນຕໍ່ສັດຕະວະແພດ
ບ້ານ , ນາຍບ້ານ ຫຼື ພະນັກງານ ສັດຕະວະແພດເມືອງທີ່ທ່ານອາໃສຢູ່



ຖ້າທ່ານມີສັດປີກເຫັງາ, ໃຫ້ແຍກມັນອອກຈາກຝູງຢ່າງໜ້ອຍ 01 ອາທິດ

ຖ້າທ່ານມີສັດປີກຕາຍໃຫ້ຂຸດຂຸມຝັງ.
ຂຸດຂຸມ ແລະ ໃຊ້ປູນຂາວໂຮຍໃສ່ພື້ນຂຸມດັ່ງກ່າວ ໃຊ້ຖົງຢາງໃສ່ມື
ແລ້ວຈັບຊາກສັດນັ້ນຖິ້ມລົງຂຸມ

ໂຮຍປູນຂາວໃສ່ຊາກສັດປີກ ແລະ ຖົມຂຸມດັ່ງກ່າວ
ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດ້ວຍສະບູ ແລະ ນ້ຳຄັກແນ່

ສັດປີກທີ່ນຳມາຈາກບ່ອນອື່ນ ຕ້ອງແຍກອອກຈາກກັນລະຫວ່າງກຸ່ມໃໝ່
ແລະ ເກົ່າຢ່າງໜ້ອຍ 2 ອາທິດ

ທຳຄວາມສະອາດຄອກສັດປີກອາທິດລະຄັ້ງ, ສ່ວນປະສົມແມ່ນໃຊ້ໃບໄມ້, ເຟືອງ, ຫຍ້າ,... ກັບນ້ຳໃສ່ອາຈົມສັດ ທຳການປີ້ນກອງອາຈົມສັດນັ້ນ 1 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ແລະ ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ຝຸ່ນນັ້ນໄດ້ຫຼັງຈາກ 3ອາທິດ.

ທຳຄວາມສະອາດສຸ່ມໄກ່ອາທິດລະຄັ້ງດ້ວຍແຟບ ແລະ ນ້ຳ

ໃຫ້ແຍກປະເພດຂອງຊະນິດສັດປີກອອກຈາກກັນ

ປຶກສານຳສັດຕະວະແພດບ້ານກ່ຽວກັບການສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ສັດປີກ

ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດ້ວຍສະບູ່ ແລະ ນ້ຳເປັນປະຈຳ ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກ
ຫຼິກຂົນໄກ່ , ຈັບບາຍສັດປີກ, ສຳພັດກັບຊີ້ນ ແລະ ໄຂ່ໄກ່



ສັດປີກແຂງແຮງ...

ຄົນແຂງແຮງ!

ຖ້າທ່ານພົບເຫັນສັດປີກເຈັບ ຫຼື ຕາຍໃຫ້ຮີບລາຍງານດ່ວນຕໍ່ ສັດຕະສະແພດບ້ານ, ນາຍບ້ານ, ພະນັກງານສັດຕະວະແພດເມືອງ ຫຼື ໂທລະສັບ 021 216380, 020 5716083

ສັດຕະວະແພດບ້ານ, ໂທລະສັບ:

ນາຍບ້ານ, ໂທລະສັບ:

ສັດຕະວະແພດເມືອງ, ໂທລະສັບ:

ບັນທຶກ:

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ

ການຮ່ວມມື ລາວ-ເຍຍລະມັນ
COOPERATION LAO PDR
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

USAID | ອາຊີ
ຈາກ ປະຊາຊົນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

JAPAN
Official Development Assistance

prepared by the Academy for Educational Development and FAO