

ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ສຳພັດກັບສັດປີກໃນເຂດທີ່ມີການລະບາດໂດຍບັງເອີນ (ເຊັ່ນ: ໄດ້ສຳພັດກັບໂຕໄກ ຫຼື ຂີ້ຂອງມັນ ຫຼື ຍາງຜານບໍລິເວນທີ່ມີຂີ້ໂກຕາງໆຄວນ:



ລ້າງມືຂອງທ່ານໃສ່ສະບູ ແລະລາງອອກດວຍນ້ຳທີ່ສະອາດຖ້າມີຫາກບໍ່ມີສະບູໃຫ້ໃຊ້ຂີ້ເຖົ້າແທນທຸກຄັ້ງ.



ລ້າງເຖົ້າຂອງທ່ານໃຫ້ສະອາດກ່ອນເຂົ້າໃນເຮືອນ, ໃຊ້ຢາຂາເຊື້ອຖ້າມີ, ຖ້າບໍ່ມີໃຫ້ໃສ່ສະບູ ຫຼືຂີ້ເຖົ້າ ລາງອອກດວຍນ້ຳທີ່ສະອາດ.



ຖ້າທ່ານມີອາການໄຂ້, ມີບັນຫາທາງລະບົບຫາຍໃຈ ອຫະພູມສູງກວ່າ 38°C ໃຫ້ໄປພົບແພດໝໍໂດຍທັນທີ ແລະ ເມື່ອທ່ານພົບຜູ້ໄດ້ສຳພັດປີກເທົ່າ ຫຼື ຕາຍໃຫ້ແຈ້ງສັດຕະວະແພດໂດຍຄວນ.

# ພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ວິທີການປ້ອງກັນຕົວ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ

ຊາວກະຊິກ





## ທ່ານຈະປ້ອງກັນຕົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານແນວໃດ?

ເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປົກສາມາດຕິດຕໍ່ໃສ່ຄົນໄດ້ຖ້າວ່າທ່ານ ຫາກສຳພັດກັບສັດປົກທີ່ເປັນພະຍາດ ຫຼື ຫາຍໃຈເອົາອາຫານທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດ. ວິທີຫຼີກລ້ຽງການຕິດຕໍ່ເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຄວນປະຕິບັດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.



- ລ້າງມືໃສ່ສະບູ, ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳທີ່ສະອາດກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຈັບບາຍສັດປົກ.
- ໃສ່ຕ້າອັດດັງ/ອັດປາກໃນເວລາທີ່ທ່ານປັດກວາດທຳຄວາມສະອາດຟາມເພາະວ່າທ່ານອາດຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດດ້ວຍການຫາຍໃຈເອົາເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວທີ່ມີ ໃນຝຸ່ນລະອອງທີ່ປົ່ວມາ.
- ໃຊ້ຕ້າອັດດັງ/ອັດປາກ ແລະ ສວມໃສ່ລິບມືໃນເວລາທີ່ຈັບບາຍກັບສັດປົກ ແລະ ສັດຊະນິດ ອື່ນໆ.
- ອະນາໄມອ້ອມແອ້ມບໍລິເວນທີ່ມີການລ້ຽງສັດເປັນປະຈຳ.

### ສິ່ງອື່ນໆທີ່ທ່ານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງປອດໄພຄື:

- ຫ້າມປະປ່ອຍໃຫ້ສັດປົກຫາຊະນິດເຂົ້າໃນເຮືອນທີ່ວິທີ, ຖ້າທ່ານລ້ຽງສັດປົກໄວ້ໃນເຮືອນໃຫ້ທ່ານ ຍ້າຍມັນອອກມາຮັ່ງນອກໂດຍເຮັດຄອກໃຫ້ມັນຕາງຫາກ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກເຮືອນພິສິມຄວນ.
- ເມື່ອທ່ານກັບມາຈາກຟາມກ່ອນຈະເຂົ້າໃນເຮືອນ, ທ່ານຕ້ອງຟື້ນໃຈວ່າ ຫຼຽງຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຟາມໄກຕ້ອງປິດເກີບກ່ອນ ແລະ ເກີບນັ້ນຕ້ອງລ້າງຖຽງດ້ວຍແປງຜັດ ເກີບໃສ່ແຟບ, ໃສ່ສະບູ ແລະ ລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳທີ່ສະອາດ ຫລື ໃຊ້ນ້ຳຢາຂາເຊື້ອຮຽບຮອຍແລ້ວ.
- ຫ້າມຄົວ, ຫ້າມກິນ, ຫຼື ຂາຍ ສັດປົກທີ່ເຫຼົາງ ຫລື ຕາຍ, ເພາະວ່າຖ້າມັນຕາຍຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດ ປົກ ທ່ານກໍຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດນີ້ຍ້ອນການຈັບ ຫລື ກິນມັນ.
- ຄວນກິນແຕ່ສັດທີ່ແຂງແຮງເທົ່ານັ້ນ, ຊີ້ນ, ໄຂ່ ແລະ ເລືອດຕ່າງໆຕ້ອງປຸງແຕ່ງໃຫ້ສຸກດີກ່ອນຈະຮັບປະທານ.

## ຈະປ້ອງກັນສັດລ້ຽງຂອງທ່ານແນວໃດໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປົກ ?

ນີ້ແມ່ນບາງວິທີການຂັ້ນພື້ນຖານໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ເຊື້ອຂອງ ພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປົກ.



### ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນສັດລ້ຽງຂອງທ່ານໂດຍ:

- ຄວນ, ຮັ່ງສັດປົກທັງໝົດຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນຮົ່ວ ຫຼື ຮັ່ງໃນຄອກ. ໃຫ້ຫ່າງຈາກທຸກຊະນິດໂດຍສະເພາະແມ່ນນົກປ່າ ທີ່ບິນມາຈາກບ່ອນອື່ນ.
- ຕ້ອງ, ຮັ່ງສັດທີ່ນຳມາຈາກບ່ອນອື່ນໂດຍແຍກຮັ່ງຕ່າງຫາກບໍ່ໃຫ້ຮັ່ງຮວມກັບຝູງສັດປົກທີ່ຢູ່ໃນຄອກຂອງເຮົາຢ່າງນອຍ 14 ວັນ (2ອາທິດ) ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສັດທີ່ນຳມານັ້ນບໍ່ມີອາການເຈັບປ່ວຍຫຍັງ.
- ແຍກຝູງໄກ່ອອກຈາກຝູງເປັດ ຫຼື ຝູງສັດປົກຊະນິດຕ່າງໆ.
- ສະຖານທີ່ຟາມລ້ຽງສັດປົກຕ້ອງຫ່າງໄກຈາກແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ(ທ້ວຍ, ໜອງ, ຄອງ, ບຶງ) ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັດປົກ ໄດ້ດື່ມນ້ຳຈາກແຫລ່ງນ້ຳນັ້ນ, ເພາະມັນອາດສຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດຈາກນົກປ່າທີ່ລິງມາຫລິ້ນນ້ຳນັ້ນ.





## ພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກແມ່ນຫຍັງ?

ພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ແມ່ນພະຍາດຕິດແຜດຮ້າຍແຮງຊະນິດນຶ່ງຂອງສັດປີກທຸກຊະນິດ (ເຊື່ອພະຍາດດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າໄດ້, ເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້) ສັດປີກທຸກປະເພດສາມາດຕິດເຊື້ອບາງຊະນິດຂອງຕະກູນພະຍາດໄຂ້ ຫວັດສັດປີກເຊັ່ນ: ສາຍພັນ H5N1 ສາມາດຂ້າສັດປີກທຸກປະເພດຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນເວລາສັ້ນໆ ລວມທັງຄົນເຮົາອີກດ້ວຍ. ເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວມັນບໍ່ຄືກັນກັບພະຍາດໄຂ້ຫວັດທີ່ມະນຸດເຮົາເຄີຍເປັນ. ໂດຍປົກກະຕິເຊື້ອພະຍາດນີ້ມັນຈະສົ່ງ ເຊື້ອຈາກສັດປີກຫາສັດປີກ, ບໍ່ແມ່ນຈາກການສົ່ງເຊື້ອຈາກຄົນຫາຄົນ.



## ເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກແຜ່ລະບາດແນວໃດ?

ເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກສາມາດແຜ່ລະບາດໄດ້ ຖ້າຫາກສັດປີກ ຫຼື ຄົນມີການສຳພັນກັບເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວໂດຍກົງເຊັ່ນ: ຈາກການກິນ ຫຼື ການສູບດິມຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ປົນເປື້ອນດ້ວຍເຊື້ອພະຍາດ, ຈາກສຳພັນກັບນ້ຳເມືອກ, ນ້ຳລາຍ, ເລືອດ ຫຼື ຈາກການສຳພັນກັບຂົນສັດປີກທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດບໍ່ວ່າຈະເປັນສັດປີກທີ່ເອົາລົງ ຫຼື ສັດປີກທີ່ອົບພະຍົບເຂົ້າມາ ເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ(ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍສັດຊະນິດອື່ນໆ ຫຼືຢູ່ໃນພືດ) ເພື່ອທຳການຜ່າກເຊື້ອແລະ ຂະຫຍາຍພັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມບາງເຊື້ອໄວຮັດ ເຊັ່ນ: ເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງໃນພື້ນທີ່ອື່ນໆ (ລະພາບແວດລ້ອມອື່ນໆ). ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບມະນຸດເຮົາໃນການລ້າງມືແຕ່ລະຄັ້ງຕ້ອງໃສ່ສະບູ(ຫຼືຂີ້ເຖົາ), ມື, ເກີບ, ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ພາຊະນະຕ່າງໆທີ່ໄດ້ສຳພັນກັບສັດປີກເຊັ່ນ: ເລືອດ, ນ້ຳລາຍ, ຂົນ, ສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຈະສາມາດນຳເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ແລ້ວສົ່ງເຊື້ອດັ່ງກ່າວຕິດຕໍ່ໃສ່ສັດຊະນິດອື່ນໆ ແລະ ລວມທັງສົ່ງແວດລ້ອມ.

## ຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອເຫັນສັດເຫງົາ ຫລື ສັດຕາຍ ?



ແຈ້ງໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຮູ້ໂດຍທັນທີ ຖ້າຫາກສັດປີກຂອງທ່ານມີອາການເຈັບປ່ວຍ ຫລື ມີການຕາຍເພີ່ມຂຶ້ນ.

- ຫາກທ່ານເຫັນສັດປີກເຫງົາຈຳນວນໜຶ່ງຫລືເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍທ້າມບໍ່ໃຫ້ປະປ່ອຍມັນຢູ່ໃນພ່າມດຽວກັນເດັດຂາດ, ເພື່ອປ້ອງກັນສັດປີກໃນຝູງໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພທ່ານຕ້ອງແຍກມັນອອກ ຈາກຝູງທັນທີ. ຫ້າມຄົວ, ຫ້າມກິນ, ຫຼື ຂາຍ ສັດປີກທີ່ເຫງົາ ຫລື ຕາຍ. ເວລາທ່ານເຄື່ອນຍ້າຍ ສັດເຫງົາ ຫຼື ຕາຍນັ້ນທ່ານຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດດັງ/ອັດປາກ, ໃສ່ ຊິບມື ຫຼື ຕຶງຢາງ, ໃຊ້ຊວນ ຫຼື ໃຊ້ໂມ້ຄືບເອົາສັດນັ້ນຫ້າມຈັບບາຍດ້ວຍມືເປົ່າ ໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງປ້ອງກັນຕົວເອງ ເດັດຂາດ, ເອົາຊາກສັດໃສ່ຕຶງຢາງຫຼືກ່ອງໃຫ້ຫ່າງຈາກຝູງສັດ, ຫ້າມຖິ້ມຊາກສັດ ຕາຍລົງໃສ່ຫວຍນ້ຳ ລຳຄອງ, ປຶງ ຫຼື ຕາມທົ່ງໄຮ, ທົ່ງນາຕ່າງໆ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົ້າໃກ້ກັບ ສັດເຈັບ ແລະ ຊາກສັດເດັດຂາດ.
- ລາຍງານໃຫ້ພະນັກງານສັດຕະວະແພດບ້ານ, ພະນັກງານກະສິກຳ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງຮັບຊາຍໂດຍທັນທີ.
- ຫຼັງຈາກພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມາກວດກາແລ້ວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການແນະນຳ ຫຼືກວິຊາການທັນທີ.
- ທຳການຂ້າເຊື້ອໃນບໍລິເວນລ້ຽງສັດປີກເຊັ່ນ: ກົງຂັງສັດ, ຂີ້ວ, ບໍລິເວນລ້ຽງໄກ່ ແລະ ຟາມ.





ອະນາໄມບໍລິເວນທີ່ລ້ຽງສັດປົກໃຫ້ເປັນປະຈຳສິ່ງເສດເຫຼືອຕົກຄ້າງຕ່າງໆທີ່ຕິດມານຳພາຫະນະ ຈາກ ບ່ອນອື່ນເປັນບັນຫາທາງທີ່ສຳຄັນທີ່ສັດປົກສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້. ດັ່ງນັ້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສູງການສາມາດປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- ອະນາໄມປັດທວດອາຈີມສັດອອກຈາກບໍລິເວນທີ່ລ້ຽງສັດຂອງທ່ານທຸກໆມື້, ໃຊ້ຜ້າອັດດັງ/ອັດປາກ ຫຼື ຜ້າແພ, ໃສ່ສິບມືຖ້າມີ.
- ເຝົາ ຫຼື ຝັງຂົນ ແລະ ສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໃຫ້ຫ່າງຈາກຟາມ ແລະ ສະຖານທີ່ໆ ມີຄົນ ແລະ ສັດອາໄສຢູ່. ຖ້າທ່ານຝັງສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ ຂຸມຕ້ອງຂຸດໃຫ້ເລິກເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັດອື່ນໆ ມາຂຸດຄຸ້ຍໄດ້.
- ຕາກອາຈີມສັດ(ເຊື້ອສັດ)ນັ້ນໃຫ້ຫຼາຍອາທິດກ່ອນຈະນຳໄປໃຊ້ເປັນປຸຍປົນກັບດິນເພື່ອໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດນັ້ນຕາຍ, ຫາມນຳເອົາໄປໃຫ້ໝູກິນ, ຫາມບໍ່ໃຫ້ສັດທຸກປະເພດເຂົ້າມາໂກ ຫຼື ຫາມໂຍນມັນ ກະຈາຍໄປໃນອາກາດ.
- ສຳລັບຟາມຂະໜາດນ້ອຍຄວນເຮັດອານະໄມ (ຫຳຄວມສະອາດ) ອຸປະກອນຕ່າງໆ ດ້ວຍສະບູ ຫຼື ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອທຸກໆມື້. (ຖ້າມີ)

ຫລີກລ້ຽງການນຳເອົາສັດ ຫລື ວັດຖຸ ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ນຳມາຈາກຟາມ ອື່ນ ຫລື ຕະຫລາດເຂົ້າມາໃນເຮືອນ, ເພາະວ່າ ເຊື້ອພະຍາດ ໄຂ້ຫວັດສັດ ປົກພັນເບິ່ງດ້ວຍຕາ ເປົ່າບໍ່ເຫັນໂດຍ ປົກຫະຕິ ແລ້ວທ່ານບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ ທຸກຄົງ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຈັບສຳພັດກັບ ສັດປົກມາ, ທ່ານອາດຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປົກມາກ່ອນແລ້ວທີ່ ທ່ານຈະເກີດອາການເຈັບປ່ວຍເພື່ອ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ທ່ານຈິ່ງ ປະຕິບັດ ຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:



- ຖ້າທ່ານນຳສັດປົກຂອງທ່ານທີ່ບໍ່ໄດ້ຂາຍ (ຂາຍບໍ່ອອກ) ຈາກຕະຫຼາດ, ທ່ານຕ້ອງແຍກຂັງຕ່າງ ຫາກ ຢ່າງນ້ອຍ 14 ວັນກ່ອນຈະປ່ອຍຄົນເຂົ້າສູ່ບູງເກົ້າ, (ກໍລະນີຫາກມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດ).
- ໃຊ້ແປງກັບສະບູລ້າງເກີບໂບກ ແລະ ຕີນລົດຖີບ ຫລື ລົດຈັກຟັງຈາກກັບມາແຕ່ຟາມ ຫຼື ຕະຫຼາດ ຂາຍໂກເພື່ອປ້ອງກັນການນຳເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕິດມານຳເຄື່ອງນຸ່ງ, ເກີບ ແລະ ອຸປະກອນ ຕ່າງໆ.
- ອະນາໄມຂ້າເຊື້ອ ຫລື ໃຊ້ ສະບູ ແລະ ນ້ຳກັບອຸປະກອນທຸກຢ່າງ ກ່ອນຈະນຳໃຊ້ ບາງທີ່ມັນອາດ ຈະມີສິ່ງຂອງຕົກຄ້າງ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕິດມາຈາກສະຖານທີ່ອື່ນ. ໃນນີ້ອາດຈະຕິດມານຳ ເຄື່ອງນຸ່ງ, ອຸປະກອນ, ກິງຂັງ(ຢາງໂກ), ຕີນລົດຖີບ ແລະ ຕີນລົດຕ່າງໆ ຂອງຄົນໃນຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ມາຢ້ຽມ.
- ໃນກໍລະນີມີການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປົກຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາອຸປະກອນ ຫລື ພາຫະນະຕ່າງໆຈາກຟາມອື່ນເຂົ້າມາໃນຟາມ.
- ຫ້າມນຳເອົາສັດປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂກນ້ອຍ, ເປັດນ້ອຍ ຫຼື ໝູນ້ອຍຈາກຟາມອື່ນ ມາລ້ຽງ ປົນກັບ ຝູງສັດໃນຟາມໂດຍບໍ່ໄດ້ແຍກຂັງຕ່າງຫາກພາຍໃນ 14 ວັນກ່ອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າສັດເຫຼົ່ານັ້ນ ເບິ່ງຄືວ່າຍັງແຂງແຮງຢູ່ກໍຕາມ. ບາງທີ່ມັນອາດຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດແລ້ວກໍເປັນໄປໄດ້